

Dose / Dose

To replace maternal colostrum /
Comme substitut au colostrum maternel

# of Packages / # de paquets	Amount IgG Fed / Quantité d'IgG administrée	Amount Water / Quantité d'eau
2 (450 g)*	120 g	5 cups / tasses
3 (675 g)	180 g	7.5 cups / tasses

To supplement maternal colostrum /
Comme supplément au colostrum maternel

# of Packages / # de paquets	Amount IgG Fed / Quantité d'IgG administrée	Amount Water / Quantité d'eau
1 (225 g)	60 g	2.5 cups / tasses

* must feed by nipple bottle / doit nourrir au biberon avec tétine

Storage / Entreposage

Store out of direct sunlight in a dry location at or below 25°C.

Conservez dans un endroit sec à température ambiante, égale ou inférieure à 25 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil.



Manufactured by /
Fabriqué par:
The Saskatoon Colostrum Company Ltd.
Saskatoon, SK S7K 6A2
www.sccl.com
support@sccl.com



Natural bovine colostrum
Colostrum bovin naturel

Contents / Contenu:
IgG ≥ 60 g

Net Weight / Poids net:
225 g powder / poudre



Bovine Dried Colostrum

Colostrum bovin déshydraté

HeadStart®



To replace or supplement maternal colostrum

Pour remplacer ou compléter le colostrum maternel

For Animal Use Only
Destiné aux animaux seulement

Product of Canada
Produit du Canada

Can. Vet. Biol.
Etab. Lic. No. 44
Perm. can. établ.
prod. vét. N° 44

Rev. 08/2020 RS001



Bovine Dried Colostrum
Colostrum bovin déshydraté
HeadStart®

Indications / Indications

To replace or supplement maternal colostrum as an aid in the treatment of Failure of Passive Transfer (FPT) in newborn calves.

Sert de substitut au colostrum maternel ou de supplément comme aide au traitement de l'échec du transfert passif (ETP) chez les veaux nouveau-nés.

Directions / Modes d'emploi

Mix the powder with water (43 to 49°C) and feed within 2 hours of birth. Calves should receive a second feeding of colostrum within 8 hours. Feeding additional amounts provides health benefits and is recommended when calves are stressed or disease incidence is high. Consult your veterinarian.

Mélangez la poudre avec de l'eau (43 à 49 °C) et faites ingérer dans les deux (2) heures qui suivent la naissance. Les veaux doivent recevoir un deuxième nourrissage de colostrum dans un délai de huit (8) heures. L'ingestion du produit en quantités supérieures à celles prescrites apporte d'avantage de bienfaits pour la santé et est recommandée si le veau est stressé ou si l'incidence de maladies est élevée. Consultez votre vétérinaire.